

one ການກະທຳທີ່ກ້າຫານ

ຢຸດເຊົາການນຳໃຊ້ຢາ OPIOID ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນ. ແບ່ງປັນຂໍ້ເທັດຈິງ. ມັນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ພຽງບາດກ້າວດຽວ. ໜຶ່ງການກະທຳທີ່ກ້າຫານ. ໜຶ່ງການສົນທະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປ້ອງກັນການນຳໃຊ້ຢາ Opioid ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານສາມາດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.



ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຢາ Opioid ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເສຍຊີວິດຈາກການບາດເຈັບໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນການກິນຢາເກີນປະລິມານຫຼາຍກ່ວາຍ້ອນອຸບັດເຫດລົດຕຳກັນ.¹



ໃນແຕ່ລະມື້, ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ພະແນກສຸກເສີນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢາ Opioid ຕາມຄຳແນະນຳ.²



ໃນປີ 2015, 718 ຄົນໃນ ລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ opioids.¹

ທາງເລືອກຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ

ຫ້າມແບ່ງປັນຢາ opioid ຕາມແພດສັ່ງໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນ.

ວຽກປິ່ນປົວ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃຫ້ໂທຫາສາຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການຟື້ນຟູຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທີ່ເບີ **1 (866) 789-1511**.

ກຳຈັດຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມຢ່າງປອດໄພໃສ່ໂຄງການເກັບຢາກັບຄືນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ. ຊອກຫາໄດ້ທີ່ TakeBackYourMeds.org.

ຮັບຮູ້ຂໍ້ ເທັດຈິງ

ຢາ Opioid ແມ່ນຫຍັງ?

ຢາ Opioid ແມ່ນເປັນຢາສະເພາະກຸ່ມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ.

ຢາເຮໂຣອິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນເປັນຢາ opioid ຊະນິດໜຶ່ງ ຄືກັນກັບຢາແກ້ປວດຫຼາຍຊະນິດທີ່ແພດສັ່ງ.

ຢາ Opioid ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສູນກາງໃຫ້ລາງວັນໃນສະໝອງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ຕິດຢາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແຮງ.³

ທາງເລືອກ ໃນການບັນ ເທົາຄວາມ ເຈັບປ ວດອື່ນໆ



ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາ Opioid ຕາມແພດສັ່ງ, ໃຫ້ລົມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບທາງເລືອກອື່ນ.



ປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເຊິ່ງພຶດຕິກຳ ກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດໄດ້.²



ລອງໃຊ້ວິທີການກາຍຍະບຳບັດ ຫຼື ການບຳບັດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການຝັງເຂັມ ຫຼື ການນວດ.²

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່

GetTheFactsRx.com

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ¹ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຫ່ງລັດວໍຊິງຕັນ

²ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດ

³ສະຖາບັນຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບໄວລຸ້ນ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
kingcounty.gov/overdose



King County

Washington State
Health Care Authority